



CONSULTORI D'OFTALMOLOGIA I MICROCIRURGIA OCULAR



Aplicació de pomada



Aplicació de col·liris

Consells Pràctics

Instruccions per a la utilització de pomades i col·liris

- Instil·li el medicament per dins de la parpella inferior.
- Si ha d'instil·lar un segon col·liri, esperi de 3 a 5 minuts.
- És fonamental que l'extrem del comptagotes del tub estigui net. Eviti el contacte amb altres objectes i, especialment, amb els dits o amb qualsevol part de l'ull.
- Conservi l'envàs a temperatura ambient; mantingui'l refrigerat només si li han indicat que ho faci.
- Apliqui el medicament només a l'ull per al qual se li hagi receptat.
- No comparteixi els medicaments amb altres persones.
- Utilitzi només els medicaments oculars receptats pel seu oftalmòleg.
- No instil·li mai un col·liri que hagi canviat de color.
- No canviï el col·liri de recipient.
- Si ha d'aplicar-se col·liri i pomada, instil·li primer les gotes.
- Segueixi sempre les instruccions del prospecte i les del seu oftalmòleg.
- No se salti les dosis i mai s'apliqui el tractament més vegades o durant més temps de l'indicat pel seu oftalmòleg.
- Mantingui els medicaments oculars fora de l'abast dels nens.

Consejos Prácticos

Instrucciones para la utilización de pomadas y colirios

- Instile el medicamento por dentro del párpado inferior.
- Si va a instalar un segundo colirio, espere de 3 a 5 minutos.
- Es fundamental que el extremo del cuentagotas o del tubo esté limpio. Evite el contacto con otros objetos y, en especial, con los dedos o con cualquier parte del ojo.
- Conserve el envase a temperatura ambiente; manténgalo refrigerado sólo si se le ha indicado que lo haga.
- Aplique el medicamento sólo en el ojo para el que se le ha recetado.
- No comparta los medicamentos con otras personas.
- Utilice sólo los medicamentos oculares recetados por su oftalmólogo.
- No instile nunca un colirio que haya cambiado de color.
- No cambie el colirio de frasco.
- Si va a aplicarse colirio y pomada, instile primero las gotas.
- Siga siempre las instrucciones del prospecto y las de su oftalmólogo.
- No se salte las dosis y nunca se aplique el tratamiento más veces o durante más tiempo del indicado por su oftalmólogo.
- Mantenga los medicamentos oculares fuera del alcance de los niños.